	BBR0281 SIMILASAN-DRY®, gotas oftálmicas estéreis		
Menge / Inhalt	10 ml	Farben	Schwarz
Grösse	155 x 240 mm	Datum / Visum	01.07.2021 / DK1

Medicamento  
homeopático



Gotas oftálmicas  
10 mL

## SIMILASAN-DRY®, gotas oftálmicas estéreis

V.1.0 BBR0281

### BULA DO PACIENTE

#### SIMILASAN-DRY®

Atropa belladonna D6,  
Euphrasia officinalis D6,  
Mercurius corrosivus D6

Medicamento Homeopático

Solução Oftálmica Estéril

Apresentação:

Contém 1 frasco de 10 ml

**USO ADULTO E PEDIÁ-  
TRICO ACIMA DE  
2 ANOS**

Composição: Cada ml  
contém:

Atropa belladonna D6 –  
0,303 ml, Euphrasia officina-  
lis D6 – 0,303 ml, Mercurius  
corrosivus D6 – 0,303 ml,  
Excipientes q.s.p. 1 ml  
(ácido bórico, borato de  
sódio decaidratado, nitrato de  
sódio, sulfato de prata, água  
ultrapurificada).

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

SIMILASAN-DRY® é indicado  
como auxiliar no tratamento  
dos sintomas decorrentes  
de irritações oculares  
como secura, inflamação,  
vermelhidão nos olhos e  
conjuntiva, sensação de areia  
nos olhos.

#### 2. COMO ESTE MEDICA- MENTO FUNCIONA?

**As indicações terapêuticas  
deste medicamento foram  
definidas conforme dados  
publicados na literatura  
homeopática. Este medica-  
mento não foi submetido a  
estudos clínicos para com-  
provação de eficácia.**

Este medicamento é preparado  
de acordo com os princípios  
homeopáticos incluindo o

princípio básico de “semel-  
hante pode ser curado pelo  
semelhante”. Ele auxilia as  
próprias energias de cura  
do organismo ao invés de  
substituí-las.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve  
ser utilizado no caso de hiper-  
sensibilidade a qualquer um  
dos componentes da fórmula.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte um médico caso a  
sua condição não melhore  
dentro de 2 a 3 dias ou se sua  
condição piorar.

Procure um médico se apenas  
um olho for afetado, se o olho  
estiver excessivamente dolo-  
rido ou se a sua visão estiver  
embaçada.

Durante qualquer inflamação  
nos olhos não se aconselha  
o uso de lentes de contato.  
Se, no entanto, for imperioso  
utilizá-las, elas devem ser  
removidas antes da admi-  
nistração do medicamento  
e serem recolocadas, no  
mínimo, depois de 15 minutos.  
O uso de lentes de contato  
tende a deixar os olhos mais  
sensíveis.

Não utilize o medicamento  
se a solução mudar de cor ou  
ficar turva.

**Utilize durante a gravidez  
ou lactação somente após  
consulta médica apropriada.  
Este medicamento pertence  
à categoria C de risco na  
gravidez.**

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE

#### MEDICAMENTO?

Armazenar em local seco a  
temperatura ambiente – até  
30 °C.

Prazo de validade: 36 meses.

**Número de lote e datas de  
fabricação e validade:  
vide embalagem.**

**Não use medicamento com  
o prazo de validade vencido.  
Guarde-o em sua embalagem  
original.**

**Após aberto, válido por  
30 dias.**

Características físicas e  
organolépticas do medi-  
camento: líquido límpido,  
incolor, sem odor e sabor.

**Antes de usar, observe o  
aspecto do medicamento.**


**Caso ele esteja no prazo de  
validade e você observe  
alguma mudança no aspecto,  
consulte o farmacêutico para  
saber se poderá utilizá-lo.  
Todo medicamento deve ser  
mantido fora do alcance das  
crianças.**

**Proteger da luz solar e de  
fontes de radiação eletromag-  
nética como, por exemplo:  
forno de microondas, aparelho  
celular, televisão, etc.**

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Desde que não prescrito de  
outra forma, utilizar uma a  
duas gotas, se necessário,  
várias vezes ao longo do dia  
ou da noite. A duração do  
efeito do medicamento  
homeopático pode ser dife-  
rente em cada indivíduo, ele  
deve ser reaplicado quando o  
seu efeito cessar ou quando  
os sintomas forem percebidos  
novamente.

Se lentes de contato forem  
utilizadas, recomenda-se

	BBR0281 SIMILASAN-DRY®, gotas oftálmicas estéreis		
Menge / Inhalt	10 ml	Farben	Schwarz
Grösse	155 x 240 mm	Datum / Visum	01.07.2021 / DK1



## SIMILASAN-DRY®, gotas oftálmicas estéreis

V1.0 BBR0281

aplicar o medicamento no fim do dia, após a remoção das lentes, e de manhã, no mínimo 15 minutos de colocá-las.

Apertar o conta-gotas de plástico entre o polegar e o indicador e administrar as gotas nos olhos.

Evitar o contato entre a ponta do conta-gotas e o globo ocular, cílios ou dedos.

Recolocar a tampa imediatamente após o uso.

Utilizar antes do vencimento do prazo de validade.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 3 dias, consulte um profissional de saúde.**

**No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente.**

**Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima aplicação.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Os componentes ativos deste medicamento são ultra-diluídos pelo processo de dinamização, de acordo com a farmacopeia homeopática e, portanto, não são tóxicos e não causam efeitos colaterais conhecidos. Raramente pode ocorrer a exacerbação inicial dos sintomas antes que uma melhora seja percebida. Isto faz parte do processo de cura homeopática.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Até o momento não são conhecidos sintomas de superdose com este medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 238/2018.

**Responsável Técnico:**  
Dr. Raul Diniz Ragazzi  
CRF-SP nº 56686

#### Registrado e importado por:

Avenida Manoel Monteiro de Araujo, 1051 - Lote B  
Parque São Domingos,  
São Paulo, SP  
CNPJ: 61.129.409/0003-69  
SAC: 0800 2098080

**Fabricado por:**  
Similasan AG  
Chriesiweg 6  
CH-8916 Jonen  
Suíça

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.